

MI EXPERIENCIA DE SEGUIMIENTO

Para registrar sus síntomas y anotaciones,
y compartirlos con su dermatólogo.

SOTYKTU (deucravacitinib) es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con psoriasis en placas de moderada a severa que pueden beneficiarse del uso de inyecciones o píldoras (terapia sistémica) o tratamiento con luz ultravioleta o UV (fototerapia). No se conoce si SOTYKTU es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

SOTYKTU puede causar efectos secundarios graves, incluidas:

Reacciones alérgicas graves. Deje de tomar SOTYKTU y busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: sensación de desmayo; hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o apretamiento de la garganta; apretamiento del pecho; erupción cutánea, ronchas.

Vea [Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 5-8](#), e [Información de Prescripción completa para EE. UU.](#) y la [Guía del Medicamento para SOTYKTU](#).



CREE UN ÁLBUM DE FOTOS DE LOS SÍNTOMAS EN SU TELÉFONO

SOTYKTU ^{6 mg / 300 mg} SUPPORT
(deucravacitinib)

Ahora que toma SOTYKTU, es una buena idea usar la cámara de su teléfono para dar seguimiento a cómo le ha funcionado y compartirlo con su dermatólogo. Aquí cómo crear un álbum en su teléfono solo para fotos de sus síntomas.

- Abra la aplicación de **“Fotos”** en su teléfono
- Cree un **álbum nuevo**
 - Para iPhone, pulse el botón de **“Álbumes”** en la parte inferior de la pantalla, luego el símbolo de **“+”** en la parte superior izquierda
 - Para Android, pulse la pestaña de **“Álbumes”**, luego el menú en la parte superior (tres puntos verticales), luego **“Crear”**
- **Denomine su álbum** (“Mis fotos de la psoriasis,” por ejemplo)

Cada vez que tome una foto de sus placas, **puede guardarlas en el álbum que ha creado.**

Trate de tomar fotos de sus placas a intervalos regulares, como una vez a la semana o al mes.

Si desea compartir las fotos con su dermatólogo, **lo único que tiene que hacer es llevar su teléfono a su cita y abrir el álbum que creó.**

Vea Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 5-8, e [Información de Prescripción completa para EE. UU.](#) y la [Guía del Medicamento para SOTYKTU.](#)



Escanee el código QR

Con este puede añadir un recordatorio mensual recurrente a su calendario que le ayude a recordar añadir fotos a su álbum todos los meses.

COSAS DE LAS QUE PUEDE CONVERSAR CON SU DERMATÓLOGO

SOTYKTU ³⁶⁰ SUPPORT
(deucravacitinib) ^{6 mg} TABLETS

Tener una buena conversación con su dermatólogo es importante. Imprima varias copias de esta página y de la próxima para que le sirvan de guía en sus próximas conversaciones con su dermatólogo.

Mis logros:

Cambio en los síntomas:

Cómo le ha ido con SOTYKTU:

Áreas para mejorar:

Objetivos personales:


Otro:

Ve [Información de Seguridad Importante](#) adicional en las páginas 5-8, e [Información de Prescripción completa para EE. UU.](#) y la [Guía del Medicamento](#) para SOTYKTU.


COSAS DE LAS QUE PUEDE CONVERSAR CON SU DERMATÓLOGO

SOTYKTU[™]
(deucravacitinib) 6 mg
tablets

Imprima esta hoja y haga un círculo en las áreas que representan partes de su cuerpo de las que desea hablar con su dermatólogo en su próxima cita de seguimiento.



Frente



Atrás

Vea Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 5-8, e [Información de Prescripción completa para EE. UU.](#) y la [Guía del Medicamento](#) para SOTYKTU.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SOTYKTU[™]
(deucravacitinib) 6 mg
tablets

INDICACIÓN

SOTYKTU (deucravacitinib) es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con psoriasis en placas de moderada a severa que pueden beneficiarse del uso de inyecciones o píldoras (terapia sistémica) o de tratamiento que usa luz ultravioleta o UV (fototerapia).

No se conoce si SOTYKTU es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE acerca de SOTYKTU (deucravacitinib)

SOTYKTU puede causar efectos secundarios graves, incluidas:

Reacciones alérgicas graves. Deje de tomar SOTYKTU y busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:

- sensación de desmayo
- hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta
- dificultad para respirar o apretamiento de la garganta
- apretamiento del pecho
- erupción cutánea, ronchas

Infecciones. SOTYKTU es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. SOTYKTU puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones y puede aumentar el riesgo de infecciones. Algunas personas han contraído infecciones graves mientras toman SOTYKTU, como infecciones pulmonares, incluidas neumonía y tuberculosis (TB), y COVID-19.

- Su proveedor de la salud debe verificar la posibilidad de infecciones y TB antes de comenzar el tratamiento con SOTYKTU y vigilarlo de cerca por la posibilidad de signos y síntomas de TB durante el tratamiento de SOTYKTU.
- Pudiera recibir tratamiento contra TB antes de comenzar el tratamiento de SOTYKTU si tiene antecedentes de TB o padece de TB activa.
- Si contrae una infección grave, su profesional de la salud puede indicarle que deje de tomar SOTYKTU hasta que su infección esté controlada.

SOTYKTU no debe usarse en personas con una infección grave activa, incluidas infecciones localizadas. No debe comenzar a tomar SOTYKTU si tiene algún tipo de infección a menos que su profesional de la salud le diga que puede hacerlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

SOTYKTU[™]
(deucravacitinib) 6 mg
tablets

Puede correr un mayor riesgo de desarrollar culebrilla (herpes zóster).

Antes de comenzar SOTYKTU, comuníquese con su profesional de la salud si:

- recibe tratamiento para una infección, o ha padecido una infección que no desaparece o recurre
- ha tenido TB o ha estado en contacto cercano con alguien que padece de TB
- tiene o ha tenido hepatitis B o C
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como:
 - fiebre, sudoración o escalofríos
 - dolores musculares
 - pérdida de peso
 - tos
 - falta de aliento
 - flema (mucosidad) con sangre
 - piel tibia, rojiza o dolorida o llagas en el cuerpo distintas de las de la psoriasis

- diarrea o dolor estomacal
- ardor al orinar u orinar más frecuente de lo normal
- sensación de mucho cansancio

Después de comenzar a tomar SOTYKTU, llame a su profesional de la salud de inmediato si tiene una infección o tiene síntomas de una infección.

SOTYKTU puede hacerlo más propenso a contraer infecciones o a empeorar cualquier infección que tenga.

Cáncer. Se han informado de ciertos tipos de cánceres, incluido linfoma, en personas que toman SOTYKTU. Comuníquese con su profesional de la salud si alguna vez ha padecido de algún tipo de cáncer.

Problemas musculares (rabdomiólisis). SOTYKTU puede causar problemas musculares que pueden ser severos. El tratamiento con SOTYKTU puede aumentar el nivel de una enzima en la sangre conocida como creatina fosfocinasa (CPK, por sus siglas en inglés) que puede ser señal de daño muscular. Un aumento de CPK es común en personas que toman SOTYKTU. Su profesional de la salud puede indicarle que deje de tomar SOTYKTU si el nivel de CPK en la sangre es demasiado

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

SOTYKTU[™]
(deucravacitinib) 6 mg
tablets

alto o si presenta signos y síntomas de problemas musculares severos. Infórmele a su profesional de la salud de inmediato si presenta cualquiera de estos signos o síntomas de problemas musculares severos: dolor, sensibilidad al tacto o debilidad muscular sin explicación, sensación de mucho cansancio, fiebre u orina color oscuro.

No tome SOTYKTU si es alérgico al deucravacitinib o a cualquiera de los ingredientes de SOTYKTU.

Antes de tomar SOTYKTU, infórmele a su profesional de la salud de todos sus padecimientos, entre ellos si: tiene problemas hepáticos o renales, tiene niveles altos de grasas en la sangre (triglicéridos) o recién ha recibido o tiene programado recibir una inmunización (vacuna), pues debe evitar recibir vacunas atenuadas durante el tratamiento con SOTYKTU.

Comuníquese con su profesional de la salud si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o está lactando o tiene planes de lactar. No se conoce si SOTYKTU puede causar daño al feto o si SOTYKTU pasa a la leche materna.

- Notifique los embarazos a la línea de notificación de Eventos Adversos de Bristol Myers Squibb Company al 1-800-721-5072

Infórmele a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos herbarios. Mantenga una lista de estos para mostrarla a su profesional de la salud y farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

Tome SOTYKTU tal y como su profesional de la salud le indica. Tome SOTYKTU 1 vez al día, con o sin alimentos. No triture, parta ni mastique las tabletas de SOTYKTU.

SOTYKTU puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Cambios en ciertos resultados de pruebas de laboratorio.** Han ocurrido cambios en pruebas de laboratorio en algunas personas que toman SOTYKTU. Su profesional de la salud puede hacer análisis de sangre antes de comenzar a tomar SOTYKTU y durante el tratamiento con SOTYKTU para verificar lo siguiente:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

SOTYKTU[™]
(deucravacitinib) 6 mg
tablets

- **Aumento de triglicéridos.** Demasiada grasa en la sangre puede causar problemas cardiacos.
- **Aumento de enzimas hepáticas.** Si las enzimas hepáticas aumentan demasiado, puede que su profesional de la salud tenga que hacer pruebas hepáticas adicionales e indicarle que deje de tomar SOTYKTU si se entiende que SOTYKTU le está causando daño a su hígado.
- **Riesgos potenciales por la inhibición de las cinasas de Janus (JAK, por sus siglas en inglés).** SOTYKTU es un inhibidor de la tirosina cinasa 2 (TYK2). La TYK2 es parte de la familia de las JAK. No se conoce si tomar SOTYKTU posee los mismos riesgos que cuando se usan los inhibidores de JAK. Ha ocurrido un aumento en el riesgo de muerte (por cualquier causa) en personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiaca (cardiovascular) que usaron un inhibidor de JAK para tratar la artritis reumatoide (AR) en comparación con personas que tomaron otro medicamento en la clase de medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF. SOTYKTU no es para usarse en personas con AR.

Los efectos secundarios más comunes de SOTYKTU incluyen: resfriado común, dolor de garganta y sinusitis (infecciones del tracto respiratorio superior), úlceras bucales (herpes simple), llagas dentro de los labios, encías, lengua o paladar (aftas), inflamación de los folículos pilosos (foliculitis) y acné.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de SOTYKTU.

Llame a su médico para recibir consejo médico respecto a los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [Información de Prescripción completa para los EE. UU.](#), incluida la [Guía del Medicamento para SOTYKTU](#).

CONSEJOS PARA RECORDARLE TOMAR SOTYKTU UNA VEZ AL DÍA

SOTYKTU ³⁶⁰ SUPPORT
(deucravacitinib) ^{6 mg} ^{tablets}

Seguir el plan de tratamiento discutido con su dermatólogo puede ser importante para mantenerse en este. **Las siguientes son algunas cosas que pueden ayudarle a que sea más fácil recordar tomar su SOTYKTU una vez al día:**



Desarrolle una rutina

Tome SOTYKTU a la misma hora todos los días, o según recetado por su dermatólogo.



Use un pastillero

Un pastillero rotulado con los días de la semana puede ayudarle a cumplir con su tratamiento.



Dese un recordatorio

Coloque una nota en el espejo del baño o una alerta en su teléfono.



Registre cada dosis

Use un calendario para marcar cada vez que se tome su dosis diaria de SOTYKTU.



Manténgalo visible

Deje su medicamento en un lugar seguro que pueda verlo con facilidad.



Lleve cantidad adicional al viajar

Si va a viajar, lleve medicamento adicional en caso de que su viaje se extienda por alguna situación inesperada.

Vea Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 5-8, e [Información de Prescripción completa para EE. UU.](#) y la [Guía del Medicamento para SOTYKTU.](#)



Asistencia en una llamada
1-888-SOTYKTU (768-9588)
De lunes a viernes, 8 AM a 8 PM hora del este
SOTYKTU360SUPPORT.com



SOTYKTU, SOTYKTU 360 SUPPORT y el logotipo de SOTYKTU son marcas comerciales de Bristol-Myers Squibb Company.

© 2023 Bristol-Myers Squibb Company.

1787-PR-2300019 09/23